



www.moaibodypiercing.it

STUDIO PROFESSIONALE DI BODY PIERCING - DAL 1995-  
SALITA DEL PRIGNE 2 R - 16123 GENOVA - CELL. 347.0661852



### COME CURARE I TUOI NUOVI PIERCING

Il piercing è stato eseguito con cura e igienicamente, se seguirai scrupolosamente i seguenti consigli, per il periodo iniziale di guarigione non avrai nessun tipo di problema (per periodo iniziale di guarigione si intende il tempo necessario affinché il piercing cessi di secernere il siero e varia molto da persona a persona).

- Non toccare il piercing con le mani sporche: potrebbe infettarsi! Devi anche evitare che i piercing del corpo vengano a contatto con la saliva o altri fluidi corporei.
- Non portare i piercing del corpo scoperti per i primi tempi (palestre, locali, mezzi pubblici, ecc.): non è necessario coprire il piercing con una garza o medicazione, è sufficiente la maglietta di cotone (sintetici o lana a diretto contatto potrebbero irritare).
- Evita le piscine pubbliche per un paio di settimane. Durante la stagione balneare risciacqua subito ed abbondantemente il piercing dopo avere fatto il bagno in mare ed evita il contatto con creme abbronzanti o idratanti.
- Il piercing non deve essere soggetto ad abusi pesanti prima di essere ben guarito. Non devi rimuovere il gioiello per circa un anno, rischieresti di non riuscire a reinserirlo e ti potresti ferire. Se desideri sostituire il gioiello prima di tale periodo è consigliabile fare eseguire la sostituzione da persona competente in quanto è necessario utilizzare un gioiello di adeguate misure e materiali e soprattutto sterilizzato.
- Se hai intenzione di allargare il piercing è necessario aspettare 1 o 2 mesi (a seconda del piercing) dopo la completa guarigione o dopo lo stretching effettuato. L'incremento è di 1mm per volta, ed è necessario curare il piercing per qualche giorno.
- Non forzare l'uscita del siero dalla ferita, lascialo fluire naturalmente.
- Lavati preferibilmente con detergenti neutri.

**\*Per il piercing alla lingua** risciacqua la bocca due volte al giorno con il prodotto Easy Piercing Soluzione Buccale o con un disinfettante orale per circa una settimana, risciacqua poi per altri 15 giorni con una soluzione fisiologica. Dopo un mese dall'applicazione del piercing torna in studio per sostituire la barretta con una più corta (è molto importante sostituire il gioiello per evitare un'eccessiva usura di denti e gengive). Durante la prima settimana evita le bevande bollenti ed i cibi piccanti. Inoltre riduci l'uso di alcool e tabacco ed eventualmente programma una dieta liquida o con cibi molto morbidi. In caso di infezione usa del disinfettante orale a base di clorexidina.

**\*Per tutti gli altri piercing** utilizza un cotton fioc imbevuto di un disinfettante a base di clorexidina per i primi 20 giorni (Easy Piercing Soluzione Antibatterica o Master Aid) e per il restante tempo una soluzione fisiologica (Easy Piercing Siero Fisiologico), rimuovi le crosticine che si formano sul gioiello e fallo scorrere, fai attenzione a non far entrare le crosticine nella ferita, potrebbero ferire la pelle che si sta cicatrizzando. Esegui questa operazione due volte al giorno, mattina e sera. Inoltre sotto la doccia lava bene il piercing con un sapone antibatterico (Easy Piercing Gel Lavante o Saugella Attiva PH 3.5). In caso di infezione si sono avuti dei buoni risultati coi prodotti Dalacin T o Rifocin ma consulta prima il tuo medico in quanto sono medicinali che necessitano di prescrizione medica.

**\*Per i piercing ai genitali** sia maschili che femminili cura la tua igiene intima utilizzando il Saugella Attiva PH 3.5 o se vuoi puoi anche applicare degli impacchi di soluzione fisiologica tiepida mediante una garza sterile, rimuovi le crosticine come per gli altri piercing, ogni volta e accuratamente. Utilizza il profilattico durante i rapporti sino a che il piercing non è ben guarito. In caso di infezione utilizza il Betadine Ginecologico.

NB: non usare assolutamente acqua ossigenata, amuchina, disinfettanti alcolici, polveri cicatrizzanti o pomate antibiotiche. Per qualsiasi suggerimento o controllo non esitare a rivolgerti in studio. Se decidi di usare medicinali (antibiotici o anti infiammatori) o integratori per favorire la cicatrizzazione, consulta assolutamente il tuo medico.

I tempi di guarigione sono puramente indicativi, variano da persona a persona a seconda delle condizioni fisiche, dell'igiene personale e della costanza nel curare il piercing. Anche l'uso eccessivo di droghe può ridurre la capacità del tuo corpo di far guarire il piercing, come anche l'uso eccessivo di alcool può aumentare la fuoriuscita di sangue.

### TEMPI DI GUARIGIONE

SOPRACCIGLIO : 2 MESI	LABRET: 2 MESI	DYDOE : 2 MESI	CAPPUCCIO CLITORIDE : 1 MESE
SETTO NASALE : 1 MESE E MEZZO	CAPEZZOLO : 5-6 MESI	QUEEN VICTORIA : 3 MESI	CLITORIDE : 2-3 MESI
NARICE : 2 MESI	OMBELICO: 6-8 MESI	PREPUZIO : 2 MESI	GRANDI LABBRA : 2 MESI
CARTILAGINI ORECCHIO: 3 MESI	PRINCE ALBERT : 1 MESE	FRENULO : 2 MESI	PICCOLE LABBRA : 1 MESE
LOBO: 1 MESE E MEZZO	APADRAVYA : 3 MESI	HAFADA : 2 MESI	FOURCHETTE : 1 MESE E MEZZO
LINGUA: 1 MESE	AMPALLANG : 5-6 MESI	GUICHE : 3 MESI	SURFACE : 6-8 MESI